

2010-2011 Escuela/Cuidado Diario Requerimiento Preguntas

Tdap

¿Mi estudiante de 8º grado quien recibió una dosis de Td a los 11-12 años necesita Tdap?

Sí, si han pasado 2 años o más desde su última dosis de Td.
No, si han pasado menos de 2 años desde su última dosis de Td.

¿Mi estudiante de 8º grado necesita otro Tdap, aún si recibió una dosis hace mas de dos años?

No, si el estudiante ha recibido Tdap a la edad de 11-12 o despues. Tdap es licenciado para solo una dosis, así que el estudiante no necesitará otra dosis de Tdap.

¿Hay una fecha específica para determinar si el estudiante está en cumplimiento?

El dia que empieza la escuela debería ser usado como el tiempo para determinar cumplimiento. Sin embargo, esos estudiantes que sobrepasarán los 2 años de haber recibido una vacuna Td deberían ser rastreados durante el año y recordados de recibir la vacuna Tdap.

¿En qué fecha empieza el period de 2 años para determinar el cumplimiento de estudiantes que han recibido Td?

El periodo de dos años empieza el dia que el estudiante recibe la vacuna Td.

¿Estudiantes necesitando su 10-año refuerzo deben recibir Tdap en vez de Td?

Estudiantes en grados 9-12 no son requeridos a recibir Tdap para su 10-año refuerzo en este tiempo, pero son áltamente aconsejados a hacerlo, especialmente si están en contacto con un infante menor de 12 meses o viven en una comunidad donde está ocurriendo pertussis.

Un cambio de regal propuesto requeriría a personas de 13 a 18 años de edad que no han recibido Tdap que reciban una dosis 2 años después de la última Td dosis.

¿Qué planeamiento debería ser usado para vacunar estudiantes de 8º grado quienes núnca han recibido la serie primaria de vacuna para tetanus conteniendo toxoi?

Adolescentes (7 a 10 años de edad) quienes núnca han recibido vacunas conteniendo tetanus, o cuya historia de vacunación es desconocida, deberían recibir la serie de 3-dosis. Para este grupo el Comité Consejero sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) plan de alcance recomienda Td para dosis #1, 4 semanas mas tarde Td para dosis #2, y al menos 6 meses mas tarde Td para dosis #3. Nota- Niños de este grupo y edad recibirían su Tdap en el future antes de ir al 8º grado porque entonces estarían a mas de 2 años de su ultimo Td para cubrir el requerimiento escolar de una dosis de Tdap para todos los nuevos estudiantes de 8º grado.

Adolescentes (10 a 18 años de edad) quienes núnca han recibido vacunas conteniendo tetanus, o con una historia de vacunación desconocida, deberían recibir la serie de 3-dosis. En este grupo de edad, the ACIP plan de alcance recomienda Tdap para dosis #1, 4 semanas después, Td para dosis #2, y al menos 6 meses mas tarde, Td para dosis #3. Tdap puede substituir para solo una de las 3 Td dosis.

¿Cual es el requerimiento de Tdap para un nuevo estudiante de 8º grado quien tuvo una exención de pertussis como un niño?

El estudiante necesitará una exención médica firmada si no hay una en su registro. Otra dosis de Td no sera necesaria si el estudiante no ha pasado el intervalo para otra necesaria dosis.

2010-2011 Escuela/Cuidado Diario Requerimiento Preguntas

Polio

¿Por qué la afirmación “Máximo necesario cuatro (4) dosis” fue removida de los requerimientos del Polio?

En el verano, 2009, ACIP actualizó sus recomendaciones para usar vacunas de poliovirus inactivados (IPV) en parte en respuesta a la disponibilidad de nuevas vacunas combinadas (e.g. Pentacel) que incluye un component IPV. ACIP ahora recomienda que niños reciban al menos 1 dosis de IPV a la edad de 4-6 años, aún si previamente han recibido 4 dosis o mas. El intervalo entre la siguiente a la última y la última dosis debe ser al menos 6 meses, por lo cual algunos niños pueden recibir un total de 4 dosis o mas, práctica considerada aceptable por ACIP.

¿Las nuevas recomendaciones de ACIP para IPV afectan todos los grados o simplemente nuevos estudiantes de pre-escolar?

El cambio en IPV del 2010 solo afecta a los nuevos estudiantes de kindergarten.

Varicela

¿Si un estudiante de pre-escolar no ha tenido inmunizaciones contra varicela, cuál es el intervalo mínimo entre dosis 1 y dosis 2?

Las recomendaciones del ACIP indican 3 meses. Una tarjeta en progreso es aceptable para este intervalo de 3 meses.

¿Estudiantes de kindergarten quienes han tenido la enfermedad de varicela no confirmada por un doctor necesitan inyecciones para varicela antes de empezar la escuela?

Sí. Empezando con el año escolar 2010-2011, documentación de varicela por un padre no será mas aceptada como prueba de la enfermedad para estudiantes de kindergarten. Nuevos estudiantes de kindergarten también necesitarán dos dosis de vacuna contra varicela.

¿Sería aceptable para una Enfermera Practicante proveer una declaración de que un estudiante de pre-escolar ha tenido la enfermedad de varicela?

Para el año escolar 2010-2011 la regla de la escuela indica que solo un doctor licenciado en medicina (MD) o doctor de osteopatía (DO) puede proveer la documentación de enfermedad de varicela. Sin embargo un cambio a las reglas propuesto ampliaría su alcance para incluir médicos y sus designados.

¿Es una firma estampada aceptable? Es un documento faxed que ha sido firmado por un doctor licenciado en medicina (MD) o un doctor licenciado en osteopatía (DO) aceptable?

Sí, el superintendente o designado puede aceptar una afirmación escrita faxed de la oficina de un doctor licenciado en medicina (MD) o doctor de osteopatía (DO) conteniendo una firma estampada.

¿Son declaraciones parentales firmadas que tienen la fecha de la enfermedad de varicela documentada aceptables para grados 1 a 5?

Sí, el cambio en la regla afecta solamente a nuevos estudiantes de kindergarten..

2010-2011 Escuela/Cuidado Diario Requerimiento Preguntas

Requerimientos para Cuidado Diario

¿Es el nuevo requerimiento de documentación médica como prueba de la enfermedad de varicela solamente para niños recién enrolados en cuidado diario o preescolar?

Sí, efectivo el 1 de Julio, 2010, todos los niños registrados para cuidado diario o preescolar deberían tener en su archivo una declaración médica escrita documentando prueba de la enfermedad, Proveedores de cuidado diario y preescolar son encoraginados a chequear esta documentación médica la cual será necesaria para admision a kindergarten.

¿Si un niño no recibe su primer Hib hasta que él tiene 2 años, es él requerido a recibir 3 dosis de Hib?

Si Hib es administrado siguiendo el plan de ACIP niños deberían tener 3 dosis cuando ellos tengan 2 años. Sin embargo, el número de dosis necesarias para estar al día es determinado por el product de la vacuna y la edad del niño cuando la serie fué iniciada. ACIP no recomienda vacunación rutinaria de Hib de niños saludables de 59 meses de edad o mayores , aún si ellos no tienen historia de vacunación Hib. El niño debería ser edad apropiadamente Hib inmunizado

¿Si un niño no recibe su primer Pneumococcal (PCV) hasta que tiene 2 años de edad, es él requerido a recibir 4 dosis de PCV?

Si PCV es administrado de acuerdo con ell plan de ACIP los niños deberían tener 4 dosis cuando ellos cumplan 2 años. El número de dosis que un niño necesita para completar la serie depende de la edad en que el niño la emiece. PCV no es rutinariamente recomendada para personas saludables mayores de 59 meses de edad.

1ª dosis dada	Número de dosis necesarias
7-11 meses	3
12-23 meses	2
24-59 meses	1

ACIP recomienda que una dosis adicional de PCV13 sea dada a un niño bajo la edad de cinco (5) quien recibió cuatro (4) dosis de PCV7. Niños de 24 a 71 meses de edad, con factores de riesgo de salud, deberían de seguir las recomendaciones especiales PCV de el ACIP.

¿Es el Nuevo Pneumococcal requerimiento solamente para nuevos niños enrolados en cuidado diario o preescolar?

Sí, este requerimiento será efectivo para todos los niños registrándose para cuidado diario o preescolar como nuevos enrolados en o después de Julio 1, 2010.